

## Стандартные ошибки в форме Ньюи–Веста

Работа Уитни Ньюи (Whitney K. Newey) и Кеннета Веста (Kenneth D. West), перевод которой приведен ниже, является одной из самых цитируемых и широко известных статей в экономике благодаря своей обширной области применения. Она отвечает на вопрос, как правильно оценить точность оценивания, т. е. стандартные ошибки оценки, в ситуации, когда доступные наблюдения коррелированы друг с другом. Если два наблюдения положительно коррелированы между собой, они содержат меньше информации о среднем своих математических ожиданий, чем так же распределенные, но независимые наблюдения, поскольку в первом случае отклонения от теоретического среднего обоих слагаемых чаще оказываются направлены в одну и ту же сторону. В итоге точность оценки в первом случае будет ниже, чем во втором.

Коррелированность наблюдений является типичным свойством данных, используемых в макроэкономике, финансах и международной торговле — всюду, где данные имеют структуру временных рядов, т. е. одна и та же переменная наблюдается в течение нескольких периодов. Приводимая ниже статья дает рецепт, как оценивать точность оценок в этом случае, накладывая минимальные требования на структуру данных (типа стационарности) и не ограничивая структуру зависимости. Данная статья является прекрасным примером полупараметрического оценивания временных рядов. Полупараметрическим называется состоятельное оценивание маломерного параметра — в данном случае асимптотической ковариационной матрицы — зависящего от немоделируемой бесконечномерной структуры временной корреляции между различными наблюдениями, которая не может быть оценена состоятельным образом.



**Уитни К. Ньюи**, профессор экономики Массачусетского технологического института (MIT), известен своими работами по непараметрическому и полупараметрическому оцениванию. В его интересы также входят проблемы эффективного оценивания и эффективного выбора инструментов в регрессиях.



**Кеннет Д. Вест**, профессор экономики в университете Висконсина в Мэдисоне, является известным специалистом по временным рядам, проблемам макроэкономического оценивания и прогноза.

Оба автора получили свои докторские степени (Ph. D.) в Массачусетском технологическом институте.

*A. E. Микушева*

# A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix

Whitney K. Newey and Kenneth D. West

## Простая, положительно полуопределенная оценка асимптотической матрицы ковариаций, состоятельная при наличии гетероскедастичности и автокорреляции<sup>1</sup> Уитни К. Ньюи, Кеннет Д. Вест<sup>2</sup>

**Ключевые слова:** робастная оценка матрицы ковариаций; стандартные ошибки в форме Ньюи-Веста; автокорреляция; гетероскедастичность.

**JEL classification:** C01; C10; C12; C13; C19.

*Примечание.* Ключевые слова и JEL classification добавлены переводчиком.

**M**ножество современных моделей рациональных ожиданий были оценены с помощью методологий, разработанных в (Hansen, 1982; Hansen, Singleton, 1982; Cumby, Huizinga, Obstfeld, 1983; White, Domowitz, 1984). Предложенные в этих работах методы оценивания используют следующее условие ортогональности:  $Eh_i(\theta^*) = 0$ , где  $\theta^*$  — ( $k \times 1$ ) вектор неизвестных параметров,  $h_i(\theta)$  — ( $r \times 1$ ) вектор функций, зависящих от данных и параметров модели, причем  $r \geq k$ . Это условие ортогональности может быть использовано для построения оценок  $\hat{\theta}^*$  с помощью обобщенного метода моментов (GMM, (Hansen, 1982)) путем выбора оптимального вектора  $\hat{\theta}$  в качестве решения задачи

<sup>1</sup> Оригинальная статья: Newey W. K., West K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55 (3), 703–708. © Econometric Society.

The copyright to this article is held by the Econometric Society, <http://www.econometricsociety.org/>. It may be downloaded, printed and reproduced only for personal or classroom use. Absolutely no downloading or copying may be done for, or on behalf of, any for-profit commercial firm or for other commercial purpose without the explicit permission of the Econometric Society. For this purpose, contact the Editorial Office of the Econometric Society at [econometrica@econometricsociety.org](mailto:econometrica@econometricsociety.org).

Редакция благодарит Econometric Society за разрешение на публикацию перевода статьи.

Перевод статьи выполнен студентами НИУ ВШЭ И. Станкевичем и Д. Малаховым, под редакцией профессора НИУ ВШЭ П. К. Катышева.

<sup>2</sup> Мы благодарны Stephen Cecchetti, Lars Hansen, John Huizinga и двум редакторам за полезные комментарии. Мы также благодарны NSF (Национальный Научный Фонд — *прим. редакции*) за поддержку грантами SES-8410249 и SES-8511070. Пока данная работа была в редакции, Вест был стипендиатом (National Fellow) Гуверовского института.

$$\min_{\theta} h_T(\theta)' \hat{W}_T h_T(\theta), \quad (1)$$

где  $h_T = \sum_{t=1}^T h_t(\theta) / T$  — вектор выборочных моментов  $h_t(\theta)$ , а  $\hat{W}_T$  — это (возможно) случайная, симметричная взвешивающая матрица.

Как было показано в (Cumby, Huizinga, Obstfeld, 1983; Hansen, 1982; White, Domowitz, 1984), асимптотическая ковариационная матрица  $\hat{\theta}$  выглядит следующим образом:

$$V_T = \left( H_T' W_T H_T \right)^{-1} H_T' W_T S_T W_T H_T \left( H_T' W_T H_T \right)^{-1}, \quad (2)$$

где  $H_T = \sum_{i=1}^T E h_{i\theta}(\theta^*) / T$ ,  $h_{i\theta}(\theta^*)$  —  $(r \times k)$  матрица частных производных  $h_i(\theta)$ ,  $W_T$  — неслучайная матрица такая, что  $\text{plim}(\hat{W}_T - W_T) = 0$ , а  $S_T = \sum_{s=1}^T \sum_{t=1}^T E(h_t(\theta^*) h_s(\theta^*)')$  /  $T$ . Состоятельная оценка асимптотической ковариационной матрицы необходима для того, чтобы строить доверительные интервалы и проводить тесты. Оценки  $H_T$  и  $W_T$  построить достаточно несложно, потому что  $\hat{W}_T$  есть естественная оценка  $W_T$ , а для  $H_T$  при выполнении условий регулярности из (Hansen, 1982) или (White, Domowitz, 1984) справедливо следующее утверждение:

$$H_T - \sum_{t=1}^T h_t(\hat{\theta}) / T \xrightarrow{P} 0. \quad (3)$$

Оценивание  $S_T$  намного сложнее, а также гораздо более важно, чем оценивание  $H_T$  и  $W_T$ . Как было показано в (Hansen, 1982), оптимальная GMM оценка параметра (в смысле минимизации значения  $V_T$ ) может быть получена только когда  $\hat{W}_T$  есть состоятельная оценка  $(S_T)^{-1}$ , таким образом, корректная оценка  $S_T$  крайне важна для получения оптимальных значений GMM оценок параметров. Простейшая оценка  $S_T$  может быть представлена в следующем виде:

$$\tilde{S}_T = \hat{\Omega}_0 + \sum_{j=1}^m (\hat{\Omega}_j + \hat{\Omega}'_j), \quad \hat{\Omega}_j = \sum_{t=j+1}^T \hat{h}_t \hat{h}'_{t-j} / T, \quad (4)$$

где  $\hat{h}_t = h_t(\hat{\theta})$ . Значение  $m$  — это число выборочных автокорреляций, обычно значение  $m$  принимается равным числу ненулевых автокорреляций в  $h_t(\theta^*)$ , которое известно априорно (см., например, (Cumby, Huizinga, Obstfeld, 1983; Hansen, Singleton, 1982; West, 1986)). В других ситуациях число ненулевых автокорреляций неизвестно априорно и, вообще говоря, их может быть бесконечно много (West, 1985, 1987). В таких случаях в качестве состоятельной оценки для  $S_T$  тоже можно взять  $\tilde{S}_T$  (т.е.  $S_T - \tilde{S}_T \xrightarrow{P} 0$ ), но при этом  $m$  считается функцией  $m(T)$ , зависящей от объема выборки, причем величина  $m$  с ростом выборки растет достаточно медленно (подробнее см. (White, Domowitz, 1984) и Теорему 2 ниже).

Поскольку  $\tilde{S}_T$  есть состоятельная оценка, то матрица  $\tilde{S}_T$  не должна быть обязательно положительно полуопределенной матрицей в любой конечной выборке, когда  $m$  не равно нулю. Из этого следует, что оценка матрицы  $V_T$ , в которой  $\tilde{S}_T$  играет роль средней матрицы, не обязательно должна быть положительно полуопределенной. Также это свойство  $\tilde{S}_T$  напрямую влияет на построение асимптотических доверительных интервалов и тестиро-

вание гипотез. Действительно, оцененные дисперсии и тестовые статистики могут быть отрицательными для некоторых линейных комбинаций  $\hat{\theta}$ , когда оцененная ковариационная матрица не является положительно полуопределенной. В дополнение, сама оценка  $\tilde{S}_T$  в случае, когда эта матрица не является положительно полуопределенной, может вызывать проблемы, т. к. по комментариям John Huizinga итерационные алгоритмы для расчета оптимальной GMM оценки  $\hat{W}_T = (\tilde{S}_T)^{-1}$  могут работать плохо, если  $\tilde{S}_T$  не является положительно полуопределенной.

В работах (Eichenbaum, Hansen, Singleton, 1985) и (Cumby, Huizinga, Obstfeld, 1983) были предложены методы оценивания матрицы  $S_T$  во временной области в случае, когда эта матрица положительно полуопределена. Но эти процедуры крайне тяжело применять на практике. Hansen (1982) предложил спектральные методы оценки  $S_T$ , аргументируя это тем, что в случае ковариационной стационарности предел  $S_T$  в  $2\pi$  раз больше спектральной плотности  $h_t(\theta^*)$  при нулевой частоте. Хотя подобные алгоритмы расчета оценки  $S_T$  достаточно нетривиальны, они не требуют много времени для своей реализации. Следуя работе (West, 1985), предлагается рассчитывать оценку  $\hat{S}_T$  простым способом по аналогии с  $\tilde{S}_T$ :

$$\hat{S}_T = \hat{\Omega}_0 + \sum_{j=1}^m w(j, m) (\hat{\Omega}_j + \hat{\Omega}'_j), \quad w(j, m) = 1 - \frac{j}{m+1}. \quad (5)$$

Эта оценка численно эквивалентна спектральной плотности  $h_t(\theta^*)$  в окрестности нуля, умноженной на  $2\pi$ . В качестве весов используются модифицированные весовые функции Бартлетта (Bartlett) для сглаживания выборочных автокорреляционных функций (подробнее см. (Anderson, 1971, раздел 9.2)). Заметим, что оценка  $\hat{S}_T$  строится аналогичным с  $\tilde{S}_T$  образом, но используются весовые функции  $w(j, m) = 1 - j/(m+1)$ , значения которых уменьшаются при росте  $j$ . Подобный метод оценки  $S_T$  на основе ковариационного сглаживания был предложен в работе (Doan, Litterman, 1983)<sup>3</sup>. Положительная полуопределенность матрицы  $\hat{S}_T$  следует из положительной полуопределенности выборочных автоковариационных функций.

**Теорема 1.** Матрица  $\hat{S}_T$  положительно полуопределена.

*Доказательство.* Для любого вектора  $c$  размерности  $(r \times 1)$  имеем:

$$c' \hat{S}_T c = \omega_0 + 2 \sum_{j=1}^m w(j, m) \omega(j),$$

где  $\omega(j) = \sum_{t=j+1}^T (c' \hat{h}_t)(c' \hat{h}_{t-j}) / T$ ,  $j = 0, 1, \dots, T-1$ . Пусть  $P = [p_{ij}]$  — симметричная матрица размерности  $m+1$ , причем  $p_{ij} = \omega(|i-j|)$ . Положительная полуопределенность  $P$  доказана, например, в работе (McLeod, Jimenez, 1984). Пусть  $e$  — вектор размерности  $(m+1) \times 1$ , составленный из единиц. Тогда

$$c' \hat{S}_T c = e' P e / (m+1) \geq 0. \quad (6)$$

Другой выбор взвешивающих матриц  $w(j, m)$  также позволяет получить положительно полуопределенную матрицу оценки  $S_T$ . Если вектор единиц в этом доказательстве заме-

<sup>3</sup> Doan и Litterman (1983) не доказывали ни положительную полуопределенность матрицы  $S_T$ , ни состоятельность оценки.

нить на  $(v(0,m), v(1,m), \dots, v(m,m))$ , где  $v(j, m)$  — произвольное число, можно показать, что положительная полуопределенность интересующей нас матрицы сохраняется при следующем выборе весов:

$$w(j, m) = \left( \sum_{l=0}^{m-j} v(l, m)v(l + j, m) \right) \Bigg/ \left( \sum_{l=0}^m v(l, m)^2 \right). \quad (7)$$

Также, если в качестве  $w(j, m)$  выбрана взвешивающая функция, которая задает неотрицательную оценку спектральной плотности для одномерного временного ряда, то итоговая оценка  $S_T$  снова будет положительно полуопределенной матрицей. В работе (Anderson, 1971, раздел 9.2) обсуждаются разнообразные схемы выбора весовых функций и их свойства при условиях регулярности (которые будем использовать ниже). В работе (Gallant, 1985) рассматриваются разные весовые функции и получаются результаты, очень похожие на полученные в настоящем исследовании<sup>4</sup>.

Заметим, что при фиксированных  $j$  функция  $w(j, m) = 1 - j/(m+1)$  с ростом  $m$  стремится к единице. Поэтому можно ожидать, что оценки матрицы  $S_T$ , построенные на основе сглаживающих выборочных автокорреляций и весов, которые стремятся к единице при росте  $m$ , должны быть состоятельными, если  $m$  растет с ростом размера выборки. Состоятельность таких оценок  $S_T$  может быть показана при выполнении условий регулярности, которые схожи с теми, что обсуждаются в работе (White, Domowitz, 1984), где заинтересованный читатель может ознакомиться с системой обозначений и определениями, которые приняты при обсуждении условий перемешивания. Для матрицы  $A = [a_{ij}]$ , обозначим через  $|A|$  норму  $\max_{i,j} |a_{ij}|$ .

**Теорема 2.** Предположим, что:

- (i)  $h_t(\theta) = h(z_t, \theta)$ , где  $h(z, \theta)$  измерима по  $z$  для всех  $\theta$  и бесконечно дифференцируема по  $\theta$  в окрестности  $N$  точки  $\theta^*$  почти наверное;
- (ii) (a) существует такая измеримая функция  $m(z)$ , что  $\sup_N |h_t(\theta)| < m(z)$ ,  $\sup_N |h_{t\theta}(\theta)| < m(z)$  и  $E(m(z_t)^2) < D$  для любых  $t$  для некоторой константы  $D$ ; (b) для некоторых констант  $D$ ,  $\delta > 0$ ,  $r \geq 1$  и для всех  $t$  выполнено условие  $E(h_t(\theta)^{4(\delta+r)}) < D$ ;
- (iii)  $z_t$  — последовательность с перемешиванием либо типа  $\varphi(l)$  с показателем  $2r/(2r-1)$ , либо типа  $\alpha(l)$  с показателем  $2r/(2r-1)$ ,  $r > 1$ ;
- (iv)  $E(h_t(\theta^*)) = 0$  для любого  $t$ , и последовательность  $\sqrt{T}(\hat{\theta} - \theta^*)$  ограничена по вероятности;
- (v) весовые функции  $w(j, m)$ , ( $m = 1, 2, \dots, j = 1, \dots, m$ ) ограничены, т. е.  $|w(j, m)| \leq C$  для некоторой константы  $C$  и  $\lim_{m \rightarrow \infty} w(j, m) = 1$  для всех  $j$ .

Тогда, если  $m$  выбирается как функция  $m(T)$  от размера выборки так, что  $\lim_{T \rightarrow \infty} m(T) = +\infty$  и  $\lim_{T \rightarrow \infty} [m(T)/T^{1/4}] = 0$ , то:

$$\left\{ \hat{\Omega}_0 + \sum_{j=1}^{m(T)} w(j, m(T)) [\hat{\Omega}_j + \hat{\Omega}'_j] \right\} - S_T \xrightarrow{P} 0. \quad (8)$$

<sup>4</sup> Работа (Gallant, 1985) попала к авторам настоящей статьи уже после того, как она была представлена к печати.

Доказательство Теоремы 2 дается ниже.

Предположения Теоремы 2 требуют, чтобы функции  $h_t(\theta)$  и  $h_{t\theta}(\theta)$  доминировались функцией от  $z_t$ , которая, в свою очередь, имеет равномерно ограниченный второй момент, и чтобы функции  $h_t(\theta^*)$  имели равномерно ограниченные моменты порядка чуть выше четвертого. Кроме того, корреляция между наблюдениями должна убывать с заданной скоростью по мере увеличения расстояния между наблюдениями. Состоятельность достигается, если  $m(t)$  увеличивается с ростом  $T$ , но медленнее, чем  $T^{1/4}$ .

Заметим, что если  $w(j, m)$  близка к единице для каждой пары  $j$  и  $m$ , то оценка  $\tilde{S}_T$  в выражении (4) приводится к случаю, разобранному в работе (White, Domowitz, 1984). Содержательный результат Теоремы 2 отличается от результата Теоремы 3.5 из (White, Domowitz, 1984) в следующих двух аспектах. Во-первых, скорость роста функции  $m(T)$  в Теореме 2 гораздо меньше, чем  $T^{1/3}$  и даже чем  $T^{1/4}$ . Это достигается за счет немного измененных обоснований по сравнению с работой (White, Domowitz, 1984), а не за счет использования общего класса весовых функций. Во-вторых, полученные результаты верны и для случая со значительной нелинейностью в параметрах.

Также следует отметить, что причина более низкой, чем  $T^{1/4}$ , скорости роста функции  $m(T)$  зависит главным образом от использования условий перемешивания. Если  $h_t(\theta^*)$  — скользящее среднее бесконечно высокого порядка с абсолютно суммируемыми коэффициентами и независимыми одинаково распределенными инновациями, причем инновации имеют конечные моменты четвертого порядка, то доказательства Теоремы 2 и Теоремы 7.2.3 в работе (Fuller, 1976) могут быть объединены, чтобы показать, что темп роста функции  $m(T)$ , меньший, чем  $T^{1/2}$ , является достаточным условием для того, чтобы оценка  $\hat{S}_T$  была состоятельной. С другой стороны, как отметил Lars Hansen, может быть затруднительным получение необходимого темпа роста функции  $m(T)$  в случае более слабых ограничений на зависимость, чем условия перемешивания, к примеру, для стационарной, эргодической ситуации, рассмотренной в (Hansen, 1982).

Спецификация подходящих темпов роста для функции  $m(T)$  проливает свет на принципы выбора  $m(T)$  на практике. Могут оказаться полезными методы кросс-валидации (например, (Wahba, Wold, 1975)) и тестирования (White, Domowitz, 1984). Оценка подобных предположений с помощью метода Монте-Карло или более изысканной асимптотики — одно из перспективных направлений для дальнейшего изучения. Также полезно было бы знать, могут ли методы, предложенные в работах (Cumby, Huizinga, Obstfeld, 1983) и (Eichenbaum, Hansen, Singleton, 1984), давать лучшие, чем  $\hat{S}_T$ , оценки  $S_T$  в случае, если число ненулевых автокорреляций известно априори.

*Доказательство Теоремы 2.* Последовательность симметричных матриц  $\{A_T\}$  сходится к симметричной матрице  $\{A_0\}$  тогда и только тогда, когда  $c'A_Tc \rightarrow c'A_0c$  для всех векторов  $c$ . Тогда, беря линейную комбинацию  $|c'\hat{h}_t| \leq r |c| \|\hat{h}_t\|$ , можно ограничить рассмотрение скалярным случаем с  $r = 1$ .

Обозначим  $\bar{S}_T = \sum_{t=1}^T \hat{h}_t^2 / T + 2 \sum_{j=1}^m w(j, m) \sum_{t=j+1}^T \hat{h}_t \hat{h}_{t-j} / T$  и  $h_t = h_t(\theta^*)$ . Для удобства обозначений будем опускать аргумент  $T$  в  $m(T)$ . Из неравенства треугольника и формы  $\bar{S}_T$  следует, что

$$\begin{aligned}
|\bar{S}_T - S_T| &\leq \left| \bar{S}_T - \left( \sum_{t=1}^T h_t^2 / T + 2 \sum_{j=1}^m w(j, m) \sum_{t=j+1}^T h_t h_{t-j} / T \right) \right| + \\
&+ \left| \sum_{t=1}^T (h_t^2 - E(h_t^2)) / T + 2 \sum_{j=1}^m w(j, m) \sum_{t=j+1}^T (h_t h_{t-j} - E(h_t h_{t-j})) / T \right| + \\
&+ \left| \sum_{t=1}^T E(h_t^2) / T + 2 \sum_{j=1}^m w(j, m) \sum_{t=j+1}^T E(h_t h_{t-j}) / T - S_T \right| \leq \\
&\leq \left| \bar{S}_T - \left( \sum_{t=1}^T h_t^2 / T + 2 \sum_{j=1}^m w(j, m) \sum_{t=j+1}^T h_t h_{t-j} / T \right) \right| + \\
&+ \left| \sum_{t=1}^T (h_t^2 - E(h_t^2)) / T + 2 \sum_{j=1}^m w(j, m) \sum_{t=j+1}^T (h_t h_{t-j} - E(h_t h_{t-j})) / T \right| + \\
&+ 2 \sum_{j=1}^m |w(j, m) - 1| \sum_{t=j+1}^T |E(h_t h_{t-j})| / T + 2 \sum_{j=m+1}^{T-1} \sum_{t=j+1}^T |E(h_t h_{t-j})| / T.
\end{aligned} \tag{9}$$

Четвертое слагаемое стремится к нулю при  $T$ , стремящемся к бесконечности, по Лемме 6.17 из (White, 1984) и  $\lim_{T \rightarrow \infty} m = +\infty$ .

Согласно Следствию 6.16 из (White, 1984), существует последовательность  $\gamma(l)$  ( $l = 1, \dots, \infty$ ) и константа  $D'$  такая, что  $|E(h_t h_{t-j})| < D' \gamma(j)$  для всех  $T$  и для всех  $j$ , при этом  $\sum_{l=1}^{\infty} \gamma(l) < +\infty$ . Тогда  $\sum_{t=j+1}^T |E(h_t h_{t-j})| / T < D' \gamma(j)$  для всех  $T$  и  $j$ . Так как в силу условия (v)  $\lim_{T \rightarrow \infty} w(j, m) = 1$

для всех  $j$ , то, применяя теорему о мажорируемой сходимости к счетной мере на положительных целых числах, получаем, что третий член в (9) стремится к нулю при  $T$ , стремящимся к бесконечности.

Пусть  $Z_{ij} = h_t h_{t-j} - E(h_t h_{t-j})$ . Из условия (ii) (b) следует, что существует константа  $D'$  такая, что  $E(|Z_{ij}|^{2(r+\delta)}) < D'$  для всех  $t$  и  $j$ . Доказательство Леммы 6.19 в (White, 1984) некорректно при такой постановке и не может быть использовано для того, чтобы доказать, что второй член в соотношении (9) сходится по вероятности к нулю. Однако если заменить

(в наших обозначениях) двойную сумму  $\sum_{l=j+1}^{T-1} \sum_{t=l+1}^T$  со страницы 153 в (White, 1984) суммой

с правильными индексами  $2 \sum_{l=1}^{T-j-1} \sum_{t=j+1+l}^T$  и применить те же рассуждения, что и при доказательстве Леммы 6.19 в (White, 1984), можно обнаружить, что существует константа  $D^*$  такая, что для всех  $j$  от 0 до  $T$  и для всех  $T$  выполнено неравенство

$$E \left[ \left( \sum_{t=j+1}^T Z_{ij} \right)^2 \right] \leq (T-j)(j+1)D^* \leq T(j+1)D^*, \quad j \geq 0. \tag{10}$$

Из того, что величины  $w(j, m)$  равномерно ограничены константой  $C$ , следует, что  $\sum_{j=1}^m |w(j, m)| \leq mC$ . Возьмем произвольное  $\varepsilon > 0$  и воспользуемся неравенством треугольника, монотонностью вероятности (если  $A \subset B$ , то  $\text{Prob}(A) \leq \text{Prob}(B)$ ), тем фактом, что вероятность совместного наступления нескольких событий меньше или равна суммы вероятностей отдельных событий, и неравенством Чебышева. Тогда из (10) следует, что

$$\begin{aligned} P\left(\left|\sum_{j=1}^m w(j, m) \sum_{t=j+1}^T Z_{jt}\right| / T > \varepsilon\right) &\leq P\left(\left|\sum_{j=1}^m w(j, m)\right| \left|\sum_{t=j+1}^T Z_{jt} / T\right| > \varepsilon\right) \leq \\ &\leq \sum_{j=1}^m P\left(\left|\sum_{t=j+1}^T Z_{jt} / T\right| > \varepsilon / Cm\right) \leq \\ &\leq \sum_{j=1}^m (Cm / \varepsilon)^2 D(j+1) / T = DC^2 m^3 (m+3) / (2\varepsilon^2 T). \end{aligned} \quad (11)$$

Тогда второй член в уравнении (9) сходится по вероятности к нулю в силу того, что  $m$  растет медленнее, чем  $T^{1/4}$ , неравенства (10) (с  $j=0$ ), примененного к  $\sum_{t=1}^T (h_t^2 - E(h_t^2)) / T$ , и неравенства треугольника.

В силу (iv)  $\hat{\theta}$  лежит в  $N$  с вероятностью, стремящейся к единице с ростом  $T$ , поэтому с вероятностью, стремящейся к единице, можно получить разложение среднего значения  $\bar{S}_T$  в окрестности  $\theta^*$ . Пусть  $\tilde{h}_t = h_t(\tilde{\theta})$  и  $\tilde{h}_{t\theta} = h_{t\theta}(\tilde{\theta})$ , где  $\tilde{\theta}$  — среднее из этого разложения. Тогда с вероятностью, стремящейся к единице, первый член после знака неравенства в (9) может быть записан так:

$$\begin{aligned} 2 \left| \left( \sum_{t=1}^T \tilde{h}_t \tilde{h}_{t\theta} + \sum_{j=1}^m w(j, m) \sum_{t=j+1}^T (\tilde{h}_t \tilde{h}_{t-j\theta} + \tilde{h}_{t-j} \tilde{h}_{t\theta}) \right) (\hat{\theta} - \theta^*) / T \right| &\leq \\ &\leq 2 \left( \sum_{t=1}^T m(z_t)^2 + \sum_{j=1}^m |w(j, m)| \sum_{t=j+1}^T 2m(z_t)m(z_{t-j}) \right) |\hat{\theta} - \theta^*| / T \leq \\ &\leq 2 \left( \sum_{t=1}^T m(z_t)^2 + \sum_{j=1}^m |w(j, m)| \sum_{t=j+1}^T (m(z_t)^2 + m(z_{t-j})^2) \right) |\hat{\theta} - \theta^*| / T \leq \\ &\leq 2 \left( (2Cm + 1) / \sqrt{T} \right) \left( \sum_{t=1}^T m(z_t)^2 / T \right) \sqrt{T} |\hat{\theta} - \theta^*|. \end{aligned}$$

Заметим, что в силу предположения (iv) последовательность  $\sqrt{T} |\hat{\theta} - \theta^*|$  ограничена по вероятности, а последовательность  $\sum_{t=1}^T m(z_t)^2 / T$  ограничена по вероятности в силу неравенства Маркова и предположения (ii) (a). Тогда первый член в (9) сходится по вероятности к нулю, поскольку  $m$  растет медленнее, чем  $T^{1/4}$ , и последовательность  $(2Cm + 1) / \sqrt{T}$  сходится к нулю.

Вывод теперь следует из соотношения (9), т. к. показано, что все слагаемые в правой части второго неравенства сходятся по вероятности к нулю.

*Department of Economics, Princeton University, Princeton, NJ 08544, U.S.A.  
and  
Woodrow Wilson School, Princeton University, Princeton, NJ 08544, U.S.A.*

*Manuscript received May, 1985; final revision received March, 1986.*

### Список литературы<sup>5</sup>

- Anderson T. W. (1971). *The statistical analysis of time series*. New York: John Wiley and Sons.
- Cumby R. E., Huizinga J., Obstfeld M. (1983). Two-step two-stage least squares estimation in models with rational expectations. *Journal of Econometrics*, 21 (3), 333–355.
- Doan T. A., Litterman R. B. (1983). *RATS User's manual*. Minneapolis: VAR Econometrics.
- Eichenbaum M. S., Hansen L. P., Singleton K. J. (1985). *A time series analysis of representative agent models of consumption and leisure choice under uncertainty*, manuscript.
- Fuller W. A. (1976). *Introduction to statistical time series*. New York: John Wiley and Sons.
- Gallant A. R. (1985). Dynamic nonlinear models, Ch. 9 of *Nonlinear Statistical Models*, North Carolina State University, Institute of Statistics Mimeograph Series No. 1667.
- Hansen L. P. (1982). Large sample properties of generalized method of moments estimators. *Econometrica*, 50 (4), 1029–1054.
- Hansen L. P., Singleton K. J. (1982). Generalized instrumental variable estimation of nonlinear rational expectations models. *Econometrica*, 50 (5), 1269–1286.
- McLeod I. A., Jimenez C. (1984). Nonnegative definiteness of the sample autocovariance function. *American Statistician*, 38 (4), 297–298.
- West K. D. (1985). A specification test for speculative bubbles. *Princeton University Financial Research Memorandum* No. 58.
- West K. D. (1986). A variance bounds test of the linear quadratic inventory model. *Journal of Political Economy*, 94 (2), 374–401.
- West K. D. (1987). Dividend innovations and stock price volatility. *Econometrica*, forthcoming.
- Whaba G., Wold S. (1975). A completely automatic French curve: Fitting spline functions by cross validation. *Communications in Statistics*, 4, 1–17.
- White H., Domowitz I. (1984). Nonlinear regression with dependent observations. *Econometrica*, 52 (1), 143–161.
- White H. (1984). *Asymptotic theory for econometricians*. New York: Academic Press.

<sup>5</sup> При переводе добавлены некоторые ссылки на более поздние опубликованные версии работ из списка литературы:

Eichenbaum M. S., Hansen L. P., Singleton K. J. (1988). A time series analysis of representative agent models of consumption and leisure choice under uncertainty. *The Quarterly Journal of Economics*, 103 (1), 51–78.

West K. D. (1988). Dividend innovations and stock price volatility. *Econometrica*, 56 (1), 37–61.