

Российская Академия наук
Уральское отделение
Институт экологии растений и животных
Уральское орнитологическое общество

**МАТЕРИАЛЫ
К РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ПТИЦ
НА УРАЛЕ, В ПРИУРАЛЬЕ
И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ**

Сборник статей



Издательство «Академкнига»
Екатеринбург 2002

УДК 598.2:591

Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Сборник статей и кратких сообщений. Екатеринбург: Изд-во «Академкнига», 2002. — 272 с.

ISBN 5-93472-105-4

Седьмой выпуск сообщений с новыми данными о местах гнездования, зимовки, путях миграций и залетах птиц, статьи с полным обзором орнитофауны отдельных территорий.

Сборник предназначен для орнитологов, биогеографов, преподавателей биологических факультетов, любителей птиц.

Ответственный редактор:
доктор биологических наук
В.К.Рябицев

ISBN 5-93472-105-4

© Коллектив авторов, 2002

© Оформление. Издательство
«Академкнига», 2002

РЕДКИЕ ПТИЦЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ СЕЛА ОЗЕРНОЕ (КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Ю.Ф.Вершинин

С. Озерное Звериноголовского р-на Курганской области, 641495

Наблюдения некоторых редких птиц были проведены в последние годы на юге Курганской области, в окрестностях с. Озерное (54°24' с.ш., 64°39' в.д.), расположенного в 20 км к западу от райцентра с. Звериноголовское. Эти сведения служат дополнением к обзору птиц юга Курганской области В.К. Рябцева и др. в настоящем сборнике.

Большая белая цапля *Egretta alba*. В конце мая — начале июня 2000 г. осмотрена колония (около 20 пар) цапель на островке оз. Таловка, в 4 км к востоку от с. Озерное. Гнезда располагались в затопленных водой сухих кустах ивы на высоте 20–50 см от воды, в кладках было по 2–3 яйца.

Огарь *Tadorna ferruginea*. С начала 1990-х гг. встречается каждую весну на крышах кошар в 1 км к северу от с. Озерное, численность растёт. Пара с 6–7 пуховичками встречена во второй половине июня 1999 г. на оз. Пресное, в 3 км к северо-западу от с. Озерное.

Сапсан *Falco peregrinus*. Почти ежедневно круглый год прилетает на зерноток в с. Озерное охотиться на голубей, зимой собирает до 2–3 птиц.

Дрофа *Otis tarda*. В середине сентября 2000 г. взрослую птицу (вероятно, самку) видели сидящей у проселочной дороги в 4 км к югу от с. Озерное вблизи казахстанской границы.

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus*. В конце лета 2001 г. стайка около десятка птиц держалась на берегу оз. Горькое, в 5 км к северо-западу от с. Озерное.

ПТИЦЫ РЕКИ РУССКОЙ (ЛУЦЕ-ЯХИ) И НИЗОВЬЕВ ТАЗА

В.Г.Виноградов

Институт географии Российской академии наук, Старомонетный пер., 29, Москва, 109017 E-mail biology@igran.geonet.ru, vavinogradov@mtu-net.ru

В конце июня 2002 г. мы проводили наблюдения в районе пос. Тазовский и Газсале. Затем по р. Таз поднялись до устья р. Русской. По Русской мы поднялись до 110 км по руслу от устья этой реки до впадения ее левого притока — р. Тагул. Затем спускались по Русской до протоки Старый Таз, в которую она впадает. 19–22 июля работали ниже устья Русской, в долине Таза, в районе протоки Ванепарод, затем вернулись в пос. Газсале. Работы выполнялись в рамках проекта «Кадастр животного мира Тазовского р-на ЯНАО» Научного центра «Охрана биоразнообразия» РАН.

К сожалению, погодные условия в период работ были крайне неблагоприятны для орнитологических наблюдений, так как абсолютно доминировала холодная дождливая погода с очень сильными ветрами. Выдалось всего 3 дня с летним типом погоды. Относительно пригодная для учетов наземных птиц погода наблюдалась утром лишь 6 дней, да и то последнее из них, несмотря на хорошую погоду, характеризовалось полным отсутствием активности птиц. Лето вообще отличалось крайне низкой активностью птиц, особенно голосовой. По-настоящему активно пели лишь таловка, весничка и теньковка, да токовали два вида бекасов и глухая кукушка. Достаточно отметить, что за весь маршрут мы слышали три песни варакушки, по две — овсянки-крошки и вьюрка и по одной — лугового конька и темного дрозда. У многих видов наблюдались повторные кладки, стайки нерасмножавшихся птиц и т.п. На Тазе сильно запоздал подъем сиговых рыб. Погодная и орнитологическая ситуация напомнила автору таковую в 1968 г. на Мурмане и в 1978 г. на Ямале. В этих условиях результаты маршрута следует считать скорее рекогносцировочными, а оценки обилия — прикидочными для района. Однако материалов по орнитофауне р. Русской в литературе до сих пор нет.

Грызунов на р. Русской по водоразделам не было. В поймах были довольно обычные полевки *Microtus agrestis*. Попадалась и водяная крыса *Arvicola terrestris*, но в основном в самом низу Русской и на Тазе. Под Тазовским и Газсале лемминги были, но численность была низкая.

Река Русская лежит в лесотундре. Доминируют лиственничные и, в местах с лучшим дренажем и в поймах, елово-лиственничные редколесья. Кроме ели и лиственницы, других хвойных деревьев здесь нет. В 1970–80-х гг. в бассейне реки производились геодезические и геологоразведочные работы. Память о них — гари на водоразделах — сейчас заняты березовыми или березово-лиственничными (в зависимости от возраста гари) редколесьями. Следует отметить, что в настоящее время р. Русская в части, пройденной нами, человеком совершенно не посещается. В верхней половине маршрута доминируют сухие, в основном ерниковые и ерnikово-лишайниковые, редколесья. Пространства без деревьев заняты сухими бугорковыми ерnikово-лишайниковыми тундрами. Характерной их чертой является практически полное отсутствие птичьего населения. Даже желтая трясогузка и чечетка не идут на них дальше крайних окраинных деревьев, лишь у очень редких здесь луж попадают отдельные пары фифи. Ручьи в верхней половине маршрута глубоко врезанные, v-образные, заняты высокоствольными лиственничниками с примесью ели. В нижней половине маршрута на водоразделах доминируют сырые мохово-багульниковые елово-лиственничные редколесья. Долины ручьев в нижней части преимущественно широкие, корытообразные и заболоченные. Здесь представлены бугристые тундроподобные болота, а вокруг небольших озер и вдоль расширений русел — осоковые боло-

та. Первая надпойменная терраса хорошо выражена по всему протяжению маршрута, она чрезвычайно плоская, сложена песком и занята разреженными лиственничными или елово-лиственничными с березовым подлеском редколесьями, в которых нижний ярус образует мозаика ерника, ягеля и участков голого песка. Поймы в верхней части маршрута заняты лиственничными, иногда с примесью ели, а в нижней — елово-лиственничными лесами с подлеском из ив, смородины, жимолости и т.п. Косы обрамлены полосами высокоствольных ивняков. Косы сложены песком, но под обрывами нередко каменистые отмели. Течение довольно быстрое.

В долине Таза у протоки Ванепарод доминируют ландшафты двубоского типа — протоки, соры, старицы и низкие острова, которые заняты ивовыми и березовыми лесами. На верхушках наиболее высоких островов имеются в небольшом количестве лиственницы.

Следует отметить, что путь между протокой Ванепарод и пос. Газсале в обе стороны мы проделали транзитом, поэтому почти не имеем материалов по границам ареалов птиц между этими точками.

Краснозобая гагара *Gavia stellata*. Гнездящаяся птица всего района. На Тазе и на Русской уступает в численности чернозобой гагаре примерно в 10 раз. Встречена только на руслах рек и проток.

Чернозобая гагара *G. arctica*. Обычная гнездящаяся птица всего района. На 80 км течения р. Русской встречено 10 птиц, кроме того, встречается по небольшим озерам среди болот.

Серощекая поганка *Podiceps grisegena*. Одиночная взрослая птица встречена на соре в долине Таза у протоки Ванепарод 20 июля 2002 г. Это — первая встреча вида в бассейне р. Таз. Ближайшие места гнездования — долина Оби в Томской области. По-видимому, залетная птица.

Гуменник *Anser fabalis*. Немногочисленная гнездящаяся птица. На 110 км нижнего течения р. Русской встречено всего 3 пары, но следует отметить, что июль — наиболее неблагоприятное время для наблюдений за гусями, так как они в это время ведут наиболее скрытый образ жизни.

Лебедь-кликун *Cygnus cygnus*. Обычная гнездящаяся птица района. По словам местных жителей, численность вида постоянно растет. В пройденной нами части бассейна р. Русской, где практически нет крупных озер, по-видимому, не гнездится. В первых числах июля на Тазе и в низовьях Русской встречено более сотни птиц. По-видимому, это были скопления перед откочевкой на линьку.

Чирок-свистунок *Anas crecca*. Самая многочисленная речная утка района, встречается повсюду, вплоть до мелких (6 x 7 м) зеркал воды на болотах и захламленных луж в поселках. 19 июля на Старом Тазе встречены линные нелетные птицы. К этому времени потеряли способность летать уже не менее трети из встреченных здесь чирков-свистунков.

Свиязь *A. penelope*. Многочисленная гнездящаяся птица всего района, но по численности несколько уступает шилохвосту. 22

июля на огромном плесе Таза встречена стая из 2 тыс. особей — по-видимому, линочное скопление, но птицы еще не потеряли способности летать.

Шилохвость *A. acuta*. Многочисленная гнездящаяся птица всего района. По численности уступает лишь синьге и чирку-свистунку. Гнездится даже по захламленным лужам на окраинах поселков. Первый выводок с шестью 2–3-дневными птенцами встречен 5 июля. Стаи самцов, отлетающих на линьку на север, были обычны на Тазе в первых числах июля. В долине Таза до 22 июля все встреченные птицы еще не потеряли способности летать.

Чирок-трескунок *A. querquedula*. На протоке Старый Таз и по всей р. Русской нам время от времени встречались одиночные самцы этого вида (всего 12 особей). Лишь однажды, 5 июля, на р. Русской, примерно в 100 км от устья, на узкой протоке встречена самка.

Широконоска *A. clypeata*. Обычная гнездящаяся утка района. Обычна уже у Газсале. По численности уступает связи, тем более — шилохвости и чирку-свистунку. По словам местных жителей А.А. Горчаковского и Н. Чудиновского, численность в последнее время растет. В долине Русской гнездится по небольшим старицам. Гнездится также на лужах прямо на окраине пос. Газсале. Первые линные летные птицы встречены на Старом Тазе 19 июля.

Хохлатая чернеть *Aythya fuligula*. Многочисленная гнездящаяся птица. По численности среди уток уступает лишь синьге, чирку-свистунку и шилохвости. Гнездится как по пойменным, так и по водораздельным водоемам, где выводки встречены на небольших озерах среди болот. Первый выводок с шестью совсем маленькими птенцами встречен 15 июля. Во второй и третьей декадах июля и по Русской, и по Тазу отмечались стаи по 20–80 особей, по-видимому, отлетающих на линьку.

Морская чернеть *A. marila*. Немногочисленная гнездящаяся утка долины р. Русской, где самки встречены по наиболее крупным старицам. В долине Таза самки в небольшом числе отмечены по некоторым сорам. Одиночные самцы и их группы до 10 особей отмечались повсюду.

Морянка *Clangula hyemalis*. Немногочисленная гнездящаяся птица долины р. Русской, самки встречены всего трижды. На Тазе более обычна, в низовьях — многочисленна.

Гоголь *Bucephala clangula*. Немногочисленная гнездящаяся утка проток и небольших стариц долины Русской, на Тазе мы встречали исключительно самцов.

Синьга *Melanitta nigra*. Самая многочисленная утка маршрута. Самки (явно гнездящиеся) встречаются как по старицам, так и по протокам и основным руслам рек. На озерах по болотам не встречается. Во второй–третьей декадах июля отмечались стаи по 10–50 особей, отлетающие на линьку на север.

Турпан *M. fusca*. Редкая птица как долины р. Русской (встречено всего 3 особи — самка и два самца), так и Таза. По-видимому, отдельные пары гнездятся на обоих реках.

Луток *Mergus albellus*. Обычная гнездящаяся птица проток и стариц р. Русской. На Тазе встречены только явно кочующие перед линькой особи.

Длинноносый крохаль *M. serrator*. Обычная гнездящаяся утка всех рек района. Особенно высока численность на р. Русской выше 40 км от устья.

Большой крохаль *M. merganser*. Самки встречены всего трижды — два раза на Русской и один раз на Тазе — там, где русло подходит к высокому коренному берегу. Судя по поведению, из этих трех самок две (на Русской и на Тазе) были гнездящимися.

Полевой лунь *Circus cyaneus*. Встречен всюду, обычен у Тазовска и Газсале. Самый заметный хищник долины р. Русской, гнездится по всей пройденной части долины, отмечено не менее 6 пар. В одном случае, в 30 км от устья, граница участков шла по реке, и можно было наблюдать одновременно двух самцов, охотящихся на низкой пойме по обеим сторонам русла.

Тетеревятник *Accipiter gentilis*. Одну особь наблюдали на р. Русской, в 50 км от устья, у обрыва.

Перепелятник *A. nisus*. Одну особь наблюдали на р. Русской, в 70 км от устья, на краю пойменного ивняка.

Зимняк *Buteo lagopus*. Всюду в долине Таза в 2002 г. был редок. На р. Русской не встречен ни разу.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. Обычная птица речных долин района. На р. Русской на 110 км отмечено 12 птиц, все — взрослые особи. При подъеме по Тазу встречено 9 особей.

Кречет *Falco rusticolus*. На р. Русской отмечено 3 птицы: 1 — белой и 2 — серой морф. Попытки поиска гнезд успеха не принесли, так как птицы, видимо, гнездятся здесь на деревьях, а условия для поиска гнезд среди высокого, довольно густого древостоя достаточно сложны.

Сапсан *F. peregrinus*. По словам всех местных жителей, обычная птица района. Однако мы ни разу не наблюдали его при осмотре многочисленных обрывов — как по Русской, так и по Тазу. Лишь однажды у нашего лагеря на р. Русской, в 80 км от устья и в 10 км от ближайшего подходящего обрыва, пролетела одиночная птица.

Чеглок *F. subbuteo*. В.К. Рябицевым (2002) для района не указывается. Нами встречен на Русской дважды — в 35 и в 60 км от устья, оба раза у колоний береговушки. Видимо, гнездящаяся птица долины Русской.

Дербник *F. columbarius*. Обычная птица, отмечался от поймы в районе Тазовска до самого верха маршрута. Наиболее многочислен на пройденной нами части долины р. Русской, где гнездится не менее 8 пар. В августе 2001 г. несколько раз наблюдался в пос. Тазовский.

Белая куропатка *Lagopus lagopus*. Обычная птица всего района работ. Чаще всего выводки отмечались по бугристым болотам.

Тундряная куропатка *L. mutus*. В районе пос. Тазовский и Газсале мы находили зимний помет этого вида. Видимо, зимует здесь, так как на севере Гыдана обычна.

Золотистая ржанка *Pluvialis apricaria*. На севере района обычна. По Русской встречается по заболоченным долинам ручьев, где также обычна.

Галстучник *Charadrius hiaticula*. Обычный гнездящийся вид рек района. На Русской на 80 км отмечено 9 особей. Кроме того, заселяет водораздельные песчаные раздувы и редколесья по пескам.

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus*. Для района ранее не указывался (Красная книга ЯНАО, 1997; Рябицев, 2002). Отмечено две взрослых особи. На р. Русской, в 40 км от устья, 18 июля птица пролетела вверх по течению. На Тазе, на берегу глухой протоки в районе протоки Ванепарод, встречен 20 июля. В последнем случае за 2 часа птицу трижды вспугивали с одного и того же места, но на следующий день ее там не было. Ближайшие известные места гнездования находятся в долине Оби.

Черныш *Tringa ochropus*. Редкая птица долины Русской — встречена всего трижды в пойменных лесах у небольших проток и стариц.

Фифи *T. glareola*. Самый многочисленный кулик района, может быть встречен практически всюду, кроме песчаных грив и наиболее сомкнутых высокоствольных редколесий. Первый пуховичок встречен 12 июля, но 18 июля найдена кладка со слабо насиженными яйцами, причем, судя по поведению многих птиц, компенсаторных кладок в 2002 г., вследствие очень плохой погоды, было много.

Щеголь *T. erythropus*. Многочисленная птица р. Русской, из куликов по численности уступает лишь фифи. Заселяет все влажные местообитания, но наиболее охотно — осоковые болота вокруг озер и в долинах ручьев.

Перевозчик *Actitis hypoleucos*. Обычная птица южной части маршрута. По Русской поднимается лишь на 30 км, выше его нет. 17–19 июля у устья Русской, наряду с парами, наблюдались стайки по 5–15 особей, явно предотлетные.

Мородунка *Xenus cinereus*. Самый многочисленный кулик побережий рек и озер. Встречается повсюду, вплоть до захламленных луж в поселках. По Русской на 80 км спуска учтено 27 особей. Первые пуховички встречены 16 июля.

Круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus*. Обычен в низовьях Таза, немногочислен на Русской, где гнездится как на небольших озерах среди болот, так и на старицах среди пойменных лесов.

Турухтан *Philomachus pugnax*. Обычная птица района. Тока турухтанов наблюдались непосредственно в пос. Тазовский. На р. Русской по численности немного уступает щеголю. Встречается практи-

чески по всем влажным местообитаниям. 20 июля в долине Таза встречены две стаи по 50 особей, летевшие на юг.

Длиннопалый песочник *Calidris subminuta*. Северную границу распространения этого вида обычно проводят южнее р. Русской (Тертицкий и др., 1999; Рябицев, 2002). Нами встречен дважды на болотах по долинам притоков Русской, примерно в 50 — 45 км от устья. Эти болота физиономически очень похожи на крупнобугристые болота верховьев Пякупура, где этот вид найден нами в 1990 г. в качестве обычной птицы (Виноградов и др., 1992).

Белохвостый песочник *C. temminckii*. Обычная птица окрестностей Тазовска и Газсале. На Русской и в прилежащих частях долины Таза отдельные особи встречались в первой декаде июля. Повидимому, это были кочующие птицы.

Чернозобик *C. alpina*. Немногочисленная птица окрестностей пос. Тазовский, южнее не встречен.

Гаршнеп *Limnocyptes minimus*. Встречен лишь однажды: 5 июля одиночная птица токовала у верхней точки маршрута, в 5 км ниже устья р. Тагул, над низкой поймой.

Бекас *Gallinago gallinago*. Обычная птица всего района, но на р. Русской встречается раз в 10 реже азиатского бекаса. Токует даже в пос. Тазовский, присаживаясь на столбы. Ток мы слышали до конца нашего пребывания на Русской.

? Лесной дупель *G. megala*. В 80 км от устья Русской нами наблюдалась птица, которая токовала над пойменным лесом в общем сходно с азиатским бекасом, но после токового полета всегда садилась на какую-либо сухую верхушку дерева и подолгу издавала стрекочущие звуки. В.К. Рябицев (2002) приводит такие звуки как характерные для лесного дупеля. Птицу добыть не удалось, а автор слышал ток этого вида лишь более 25 лет назад, поэтому уверенности в определении у нас нет. В.К. Рябицев (2002) проводит северо-западную границу ареала вида по истокам Таза.

Азиатский бекас *G. stenura*. Многочисленная птица района. Токует даже в пос. Тазовский. На р. Русской ток азиатского бекаса был слышен практически постоянно.

Дупель *G. media*. В пос. Тазовском одиночная птица встречена 26 июня у бровки коренного берега. Видимо, гнездится в пойме Таза.

Средний кроншнеп *Numenius phaeopus*. Встречено несколько пар по заболоченным широким долинам притоков р. Русской.

Малый веретенник *Limosa lapponica*. Распространен как предыдущий вид, но несколько более редок.

Короткохвостый поморник *Stercorarius parasiticus*. Обычная птица низовьев Таза. Самая южная встреча — у пос. Тибейсале — 22 июля.

Длиннохвостый поморник *S. longicaudus*. Обычная птица всего района. На Русской гнездится по тем же болотам, что и кроншнеп. Пара сильно волновалась у гнездовой лунки 15 июля, по-види-

мому, птенец затаился где-то рядом, но найти его не удалось. Часто можно встретить над руслом Таза.

Серебристая чайка *Larus argentatus*. В первых числах августа 2001 г. на мусорном контейнере на окраине пос. Тазовский мы наблюдали одну особь этого вида. Так как она сидела рядом с типичным халеем и в 7 м от нас, сомнений в определении этого вида, хорошо знакомого нам по работам на Северо-Западе России, у нас нет.

Халей *L. heuglini*. Обычная гнездящаяся птица района, но в лесотундре уступает по численности сизой чайке. Мы считаем приводимое здесь русское название, входящее в живой язык русского населения севера Западной Сибири, гораздо более удачным, чем мертвое книжное «восточная клуша». К тому же традиция заимствования из самодийских языков в русской орнитологии уже имеется (например, тулес).

Сизая чайка *L. canus*. В низовьях Таза немногочисленна, в лесотундре — самая многочисленная чайка. Сидящая на вершине лиственницы или на высокой ветке над рекой сизая чайка — неотъемлемая часть ночного пейзажа Русской.

Полярная крачка *Sterna paradisaea*. Многочисленная гнездящаяся птица района. Гнездится как по рекам, так и по озерам, в том числе небольшим озерам среди болот.

Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus*. Обычный вид всего района. Последнее кукование отмечено 13 июля. На р. Русской по численности заметно уступает следующему виду.

Глухая кукушка *C. saturatus*. Обычный вид района. Токование было слышно в течение всего июля.

Белая сова *Nyctea scandiaca*. Прошлогогодок встречен 27 июня на окраине пос. Тазовский, встречалась здесь и в августе 2001 г.

Болотная сова *Asio flammeus*. Обычная птица всего района. Мы неоднократно наблюдали охоту этого вида прямо между домов пос. Тазовский. Обычна и по р. Русской, где чаще всего отмечалась на болотах долин ручьев, реже — в разреженных редколесьях 1-й террасы.

Ястребиная сова *Surnia ulula*. В пойме р. Русской встречена в трех местах, всегда там, где леса наиболее высокоствольны, явно гнездится. Вечером 17 июля мы наблюдали охоту этой совы на темных полевках *Microtus agrestis*, которые пытались пересечь полосу песка на пересохшем выходе протоки, в 35 км от устья. Птица каждый раз круто планировала с противоположного высокого берега Русской и затем летела над косой на высоте не более 0,5 м. Полевок она брала в 25–30 м от нашего лагеря, совершенно не обращая внимания на палатки, костер, людей и даже собаку. Охота была на удивление успешной — за 2 часа все пять наблюдавшихся попыток были удачны.

Ласточка-береговуха *Riparia riparia*. Многочисленная гнездящаяся птица всех рек района. На р. Русской колонии от 5 до 200 норок, располагаются как в песчаных, так и в торфяных обрывах.

Луговой конек *Anthus pratensis*. Единственный вид конька, отмеченный нами на Русской. Самка, добытая 11 июля (расстояние от вершины 1-го второстепенного до вершины крыла — 21 мм), имела развитое наседное пятно. Численность коньков на Русской удивительно низка, нами отмечено не более 1,5 десятков пар, все они надежно определялись как луговые. Отмечен только по долинам ручьев и водораздельным редколесьям. Ни в пойме, ни на первой надпойменной террасе коньков мы не встречали. Таким образом, этот вид в 1990 г. был найден в бассейне Пура (Виноградов и др., 1991), а теперь — бассейне Таза, что существенно продвигает ареал вида на восток. Являются ли эти находки следствием расширения ареала или просто растет изученность территории, определенно сказать нельзя, однако более вероятным представляется рост изученности.

Краснозобый конек *A. cervinus*. Обычная птица низовьев Таза. Самая южная встреча — на кладбище у пос. Тибейсале 22 июля.

Желтая трясогузка *Motacilla flava*. Многочисленная гнездящаяся птица всего района. Заселяет не только все открытые местообитания, но и редколесья, за исключением наиболее высокоствольных и сомкнутых, обычна в поселках. Однако следует отметить, что численность вида здесь несоизмеримо ниже, чем в бассейне Пура, а в сухие бугорчатые тундры водоразделов Русской она не идет глубже последних краевых деревьев. В 2002 г., по-видимому, имел место низкий успех размножения — весь июль наблюдалось гнездование.

Желтоголовая трясогузка *M. citreola*. Многочисленная гнездящаяся птица поселков Тазовский и Газсале и их окрестностей, попадает в долине Таза. На Русской не встречена ни разу.

Горная трясогузка *M. cinerea*. Пара этих трясогузок встречена 26 июня на луже в одном из дворов пос. Тазовский.

Белая трясогузка *M. alba*. Многочисленная гнездящаяся птица всего района. Помимо рек, ручьев и поселков, изредка встречается и в разреженных редколесьях.

Серый сорокопуд *Lanius excubitor*. Редкая птица, по р. Русской отмечено всего три пары — только по песчаным редколесьям первой надпойменной террасы.

Кукша *Perisoreus infaustus*. Обычная птица редколесий по Русской. Как это характерно для данного вида, обычно не показывается на глаза, но налетает почти после каждого выстрела.

Кедровка *Nucifraga caryocatactes*. Отмечена всего один раз, 18 июля — одиночная птица в пойменном лиственнично-еловом лесу по р. Русской в 30 км от устья.

Серая ворона *Corvus cornix*. Обычная птица долины Таза, более многочисленна у поселков и пунктов рыбодобычи. Полное отсутствие серой вороны, пожалуй, наиболее резко бросающаяся в глаза черта орнитофауны р. Русской.

Ворон *C. corax*. Немногочисленная гнездящаяся птица всего района. На Русской встречено 3 выводка.

Свиристель *Bombycilla garrulus*. Обычная гнездящаяся птица пойменных лесов Русской. Необходимым требованием к местообитаниям здесь является наличие в древостое ели. Однако охотится в основном по опушкам, выбирая в качестве присады отдельно стоящие сухие деревья.

Сибирская завирушка *Prunella montanella*. Немногочисленная гнездящаяся птица водораздельных лиственничных редколесий по Русской. Встречено всего 6 пар.

Камышевка-барсучок *Acrocephalus schoenobaenus*. В качестве редкой птицы регистрировался по ивнякам в долинах ручьев — притоков Русской.

Славка-завирушка *Sylvia curruca*. Очень редкая птица пойменных лесов нижних 30 км течения Русской, гнездится по островам Таза.

Пеночка-весничка *Phylloscopus trochilus*. Многочисленная гнездящаяся птица всего района, численность возрастает на юг. Один из немногих видов птиц, который в 2002 г. довольно активно пел, уступая в этом отношении лишь таловке. Встречается по всем типам редколесий, причем на водоразделах чаще, чем в долине.

Пеночка-теньковка *Ph. collybita*. Также заселяет весь район, но по численности сильно уступает предыдущему виду. Встречается во всех редколесьях с хвойными, но наиболее многочисленна в пойменных лиственничных и елово-лиственничных лесах.

Таловка *Ph. borealis*. Наиболее активный певец в 2002 г. Обычная птица р. Русской. Здесь она селится по практически любым лесам и кустарникам в пойме реки, проникая в небольшом количестве лишь на окраины прилежащих надпойменных террас и водоразделов.

Зарничка *Ph. inornatus*. Гнездится в основном в лиственничных водораздельных редколесьях. Редка и спорадична. Может отсутствовать на большой площади, но местами в тех же местообитаниях отмечается группа гнездящихся до 10, обычно 3–5, поющих самцов, затем на большой площади ее опять нет.

Черноголовый чекан *Saxicola torquata*. Всего дважды встречен на Русской, оба раза — на буграх с вейником по старой гари.

Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe*. Обычный вид всего района. На Русской излюбленное местообитание — разреженные лиственничные редколесья по пескам 1-й террасы.

Соловей-красношейка *Luscinia calliope*. Редкий вид елово-лиственничных пойменных лесов долины р. Русской: 2 встречи.

Варакушка *L. svecica*. Многочисленный гнездящийся вид всего района. Может быть встречен во всех местообитаниях — от тундроподобных болот до поселков и лесов. Наибольшая численность наблюдается в ивниках ручьев — притоков Русской.

Синехвостка *Tarsiger cyanurus*. Дважды отмечалась в елово-лиственничных пойменных лесах р. Русской, в 30–40 км от устья.

Чернозобый дрозд *Turdus atrogularis*. Самый многочисленный дрозд пойменных лесов района. Обычен по песчаным редколе-

сыям первой террасы, на водоразделах редок. Первые выводки встречены 10 июля.

Дрозд Науманна *T. naumanni*. 5–10 июля на р. Русской, в 60–100 км от устья, мы в разных местах четыре раза встречали дроздов этого вида. Все встречи приурочены к пойменным лиственничным лесам. Видимо, гнездится здесь.

Темный дрозд *T. eunotus*. Самый многочисленный дрозд водораздельных редколесий бассейна р. Русской. 14 июля, когда наблюдалось уже довольно много покинувших гнезда выводков этого вида, было найдено гнездо с 3 слабо насиженными яйцами. Так как гнездование этого вида изучено очень слабо, даем описание гнезда. Оно находилось в водораздельном березово-лиственничном ерниковом редколесье у пятна (примерно в 1 га) ерника без деревьев. Гнездо — на старой лиственнице, на самой нижней мутовке ветвей, у ствола, на высоте 1,6 м над землей; сбоку его скрывают нависшие ветки следующей мутовки. Гнездо — массивная постройка из травы и лишайников. Лоток — аккуратная полусферическая чашечка из черной глины с толщиной стенок в 0,5 см, внутри выстлан тонкой травой. Диаметр гнезда — 22 см, лотка — 9,5 см. Высота гнезда — 12 см, лотка — 6,5 см. Яйца серовато-салатовые с бурыми размытыми пятнами, почти сливающимися на тупом конце. Размер яиц: 28,2 x 20,9; 27,2 x 23,4; 26,7 x 20,3 мм. Самка слетела, когда наблюдатель был в 2 м от гнезда. Пока гнездо обмеривали, обе птицы с беспокойными криками перелетали на расстоянии 8–10 м. Самка вернулась на гнездо, как только наблюдатель отошел примерно на 25 м.

Рябинник *T. pilaris*. На Русской — обычная гнездящаяся птица, встречающаяся в любых редколесьях, чаще — в долине, реже — на плакоре, но уступает по численности темному и чернозобому дроздам. В долине Таза обычен.

Белобровик *T. iliacus*. В 2002 г. был очень редок как на Русской, так и на Тазе — всего несколько встреч.

Певчий дрозд *T. philomelos*. По словам А.А. Горчаковского, в последние 10 лет в качестве редкой гнездящейся птицы заселил всю долину Таза. Нами не встречен.

?Сибирский дрозд *Zoothera sibirica*. В ночь с 9 на 10 июля, примерно в 65 км от устья Русской, нами наблюдался крупный и очень темный дрозд. К сожалению, условия освещения (ночные сумерки при низкой сплошной облачности) и большая дистанция (70–80 м) не позволили надежно определить эту птицу.

Сероголовая гаичка *Parus cinctus*. Мы лишь однажды слышали голос этой птицы в пойменных лесах Русской, примерно в 20 км от устья, 17 июля.

Домовый воробей *Passer domesticus*. Немногочисленная гнездящаяся птица пос. Тазовский.

Полевой воробей *P. montanus*. Обычная гнездящаяся птица пос. Тазовский и Газсале.

Юрок *Fringilla montifringilla*. Обычная птица всех типов редколесий района, но явно предпочитает наиболее густые и высокоствольные — как в пойме, так и на водоразделах. Вылупление наблюдалось с 12 июля.

Чечетка *Acanthis flammea*. Самая многочисленная птица района, обитает практически повсюду. В 2002 г. в июле нередко наблюдались стайки до 20 особей, по-видимому, значительная часть птиц утратила гнезда или не размножалась в данном году.

Чечевица *Carpodacus erythrinus*. Редкая птица долин Таза и Русской — всего 3 встречи.

Щур *Pinicola enucleator*. Наблюдался нами лишь однажды в елово-лиственничном редколесье на 1-й террасе, в 80 км от устья.

Белокрылый клест *Loxia leucoptera*. Шишки лиственниц, обработанных клестами, мы иногда находили в долинных лесах Русской, но сами птицы нами не отмечены.

Снегирь *Pyrrhula pyrrhula*. Мы лишь дважды слышали голос снегиря в долине Русской, в 80 км от устья.

Тростниковая овсянка *Emberiza schoeniclus*. Редкая птица р. Русской, где заселяет долины ручьев. Обычна на островах Таза.

Полярная овсянка *E. pallasi*. Обычна по ерниковым зарослям и на сухих гарях с подростом березы всюду в бассейне Русской.

Овсянка-крошка *E. pusilla*. Третий после чечетки и желтой трясогузки по численности вид воробьиных. Встречается практически во всех типах местообитаний.

Дубровник *E. aureola*. Одиночный самец встречен 21 июля в долине Таза на протоке Ванепарод.

Лапландский подорожник *Calcarius lapponicus*. Гнездящаяся птица окрестностей Тазовского и Газсале.

На основании последних исследований сделан вывод, что «...тундровая орнитофауна в северной тайге Западной Сибири — не единичные очаги, а обширная мозаика по столь похожим на южные зональные тундры верховым болотам» (Рябицев, Тарасов, 1998, с. 171). Вывод, безусловно, в основном верный, хотя широкое распространение здесь тулеса, отсутствующего на гнездовании в южной полосе тундр (на Ямале — Калякин, 1998, наши наблюдения, на нижнем Тазе — Жуков, 1998, наши наблюдения и т.п.), в эту схему не совсем вписывается.

С другой стороны, ясно, что распределение тундровых птиц в этой области имеет свои интересные особенности. Так, И.В. Покровской (1998) на Худосее, т.е. на 2° южнее района наших работ, найдены не зарегистрированные нами на Русской тулес, чернозобик, короткохвостый поморник, краснозобый конек и подорожник, хотя эти данные по тулесу и чернозобику не вошли в более поздний обзор (Тертицкий и др., 1999). Материал по белохвостому песочнику на бугристых болотах мы склонны считать следствием какой-то ошибки: может быть, это был длиннопалый песочник? В то же время, у Сидо-

ровска, то есть на половине расстояния между Худосеем и Русской, из этой группы найдены только короткохвостый поморник и подорожник (Тертицкий, Покровская, 1998). По-видимому, это связано с особенностями ландшафтной структуры районов. Так, по Худосею И В Покровская (1998) упоминает об обширных массивах междуречных бугристых болот, тогда как на обследованной части бассейна Русской бугристые болота — небольшие фрагменты в долинах ручьев, причем эти болота уже несут следы некоторой «переходности».

Безусловно, ядро ареала этой группировки находится на юге Пур — Надымского водораздела, а бассейн Нижней Оби явно в этот ареал не входит. Материалы по южным границам собираются (Рябицев, Тарасов, 1998 и другие работы по северу Ханты-Мансийского округа). Но особенности распространения этих видов на восток и юго-восток пока только намечаются. В отношении орнитофаунистических исследований весьма перспективными районами представляются левобережье Таза на юг от Юридейхи, низменные участки правобережья Таза от мульд среднего течения Русской до западного выступа Нижнеенисейской возвышенности, включая котловину Советских озер, а также район между Чертовской системой озер и Верхнетазовской возвышенностью. Набор серии точек позволит выявить особенности расселения этой группы птиц, центральную роль в которой играют тулес, подорожник и, возможно, чернозобик, и особенности проникновения в тайгу более широко распространенных южнотундровых и лесотундровых форм, а на бугристые болота — форм более южных (большого улиты и др.).

Несомненно также, что для выяснения особенностей распределения этой группы птиц необходимо произвести серьезную ревизию ландшафтной структуры региона, обращая основное внимание на степень расчлененности рельефа и механический состав грунтов.

ЛИТЕРАТУРА

- Виноградов В.Г., Кривенко В.Г., Панфилов А.Д. Очаг тундровой орнитофауны в верхней части бассейна реки Пур // Материалы 10-й Всесоюзной орнитологической конференции Ч 1 Витебск, 1991 С 52–53
- Виноградов В.Г., Кривенко В.Г., Парфенов А.Д. Уникальное сообщество куликов на севере Западной Сибири // Информация рабочей группы по куликам Новосибирск, 1992 С 63–65
- Жуков В.С. К фауне и распространению птиц на северо-востоке Западной Сибири // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири Екатеринбург Изд-во «Екатеринбург», 1998 С 67–77
- Калякин В.Н. Птицы Южного Ямала и Полярного Зауралья // Там же С 94–116
- Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа Екатеринбург Изд-во Урал ун-та, 1997 240 с

- Покровская И В Материалы по орнитофауне северной границы таежной зоны Западно-Сибирской равнины // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири Екатеринбург Изд-во «Екатеринбург», 1998 С 132–135
- Рябицев В К Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири Справочник-определитель Екатеринбург Изд-во Урал ун-та, 2002 608 с
- Рябицев В К , Тарасов В В Птицы верховьев реки Айкаган // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири Екатеринбург Изд-во «Екатеринбург», 1998 С 165–172
- Тертицкий Г М , Покровская И В К распространению некоторых видов птиц в лесотундре долины реки Таз // Там же С 181–182
- Тертицкий Г М , Покровская И В , Жуков В С , Варпанетов Л Г Распределение и численность гнездящихся куликов Ямало-Ненецкого автономного округа // Гнездящиеся кулики Восточной Европы Т 2 М Союз охраны птиц России, 1999 С 14–29

БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК В ВЕРХОВЬЯХ РЕКИ ПУР

В. Г. Виноградов

Институт географии Российской академии наук, Старомонетный пер 29, Москва, 109017 E-mail biology@igran.geonet.ru vavinnogradov@mtu.net.ru

Северная граница ареала **большого подорлика** *Aquila clanga* в настоящее время проводится южнее границ Ямало-Ненецкого автономного округа (Рябицев, 2002) Но в июне 1990 г в верховьях Пяку-Пура мы отметили две пары этого вида, постоянно державшиеся на определенной территории Птицы одной пары наблюдались на прилегающем к оз Пяку-то с запада участке болот и боров по песчаным гривам Другая пара держалась в долине р Хадытаяхи, в 40 км восточнее озера По-видимому, эти орлы здесь гнездились

ЛИТЕРАТУРА

- Рябицев В К Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири Справочник-определитель Екатеринбург Изд-во Урал ун-та, 2002 608 с

КУКША В ОКРЕСТНОСТЯХ АСБЕСТА

И. Ф. Вурдова

Ул Войкова, д 69 кв 41 г Асбест Свердловской области 624260

Кукш *Perisoreus infaustus*, встреченных в окрестностях г Асбеста (ок 50 км к востоку-северо-востоку от Екатеринбурга) обычно относили к кочующим птицам, т к отмечали их осенью и зимой в ноябре 1995 г — 7 птиц, в ноябре 1996 г — 1 птица, в декабре 1998 г — 2 птицы Все эти встречи были зарегистрированы примерно в одном районе — 20 км к северу от Асбеста, в радиусе около 2,5 км В начале июня 2002 г на этой