

Российская академия наук
Уральское отделение
Институт экологии растений и животных
Уральское орнитологическое общество

**МАТЕРИАЛЫ
К РАСПРОСТРАНЕНИЮ
П Т И Ц
НА УРАЛЕ, В ПРИУРАЛЬЕ
И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ**

Сборник статей

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2005

УДК 598.2:591
М 341

Ответственный редактор:
доктор биологических наук
В. К. Рябицев

М 341 **Материалы** к распространению птиц на Урале, в
Приуралье и Западной Сибири: Сб. статей и кратких
сообщ. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. — с.

ISBN....

Десятый выпуск сообщений с новыми данными о местах гнездования, зимовки, путях миграций и залетах птиц, статьями с полным обзором орнитофауны отдельных территорий.

Сборник предназначен для орнитологов, биогеографов, преподавателей биологических факультетов, любителей птиц.

ISBN....

© Коллектив авторов, 2005
© Оформление. В. К. Рябицев,
Издательство УрГУ, 2005
© Издательство Уральского
университета, 2005

Большой крохаль *M. merganser*. Редкий, по-видимому, единично гнездящийся перелетный вид. Во время весенних и осенних миграций достаточно обычен, хотя и немногочислен.

ЛИТЕРАТУРА

Гашев С. Н. К орнитофауне природного парка «Нумто» // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 1998. С. 31–35.

О СКОПЛЕНИЯХ БЕЛОЩЕКОЙ КАЗАРКИ НА РЕКЕ ЮНО-ЯХА

Т. В. Плешак

Ул. Большесельская, д. 66, кв. 30, п/о Уемский Приморского р-на
Архангельской обл., 164402

В августе 1990 г. в среднем течении р. Юно-Яха (западный берег о. Вайгач) была обнаружена стая **белощеких казарок** *Branta leucopsis* примерно из 200 особей, подпустившая автора примерно на 20 м. Птицы не убегали в тундру из-за угрозы нападения орлана-белохвоста *Haliaeetus albicilla*, парившего неподалеку.

При обследовании в августе 1991 г. нижнего течения реки примерно в 5 км от устья было обнаружено скопление казарок, в отдельных группировках насчитывалось от 12 до 300 взрослых особей с молодыми (около 400 пар взрослых птиц). Лишь в одной из стай учтено 37 холостых особей. Птицы находились как на пастьбе в тундре, так и на речных плесах в каньоне. Провести подсчет молодых не представлялось возможным из-за их покровительственной окраски и многочисленности. Исходя из того, что величина выводка в этот сезон составляла 3,46 молодых на пару взрослых казарок (Плешак, 1997), то всего в данной группировке находилось около 2,5 тыс. гусей. В ряде выводков птенцы различались по величине почти вдвое, что позволяет говорить о «приемышах».

ЛИТЕРАТУРА

Плешак Т. В. Гнездование некоторых птиц на острове Вайгач // Рус. орнитол. журнал. Экспресс-вып. 15. 1997. С. 17–20.